

**КАТАЛОГ
СОРТО-ГІБРИДНОГО СКЛАДУ
ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР,
ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ
ПОЛІГОНІ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2025 РОЦІ**

Миколаїв
2025

**CATALOG OF VARIETIES AND HYBRIDS
OF CEREAL AND GRAIN LEGUMES CROPS,
PRESENTED AT THE DEMONSTRATION FIELD OF THE
MYKOLAIV NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY IN 2025**

Mykolaiv
2025

УДК 633.1+633.35(0.83.81):378:63(477.73)

К 29

Авторський колектив:

Я. М. Гадзало, В. С. Шебанін, Г. О. Решетілов, В. М., Соколов, О. А. Демидов, Б. П. Бойнчан, М. А. Ткаченко, Н. П. Артющенко, М. В. Бузинний, О. Б. Зайцев, О. В. Бабаянц, О. І. Кордін, О. Ю. Леонов, С. В. Бут, О.А. Тарасенко, А. В. Дробітько, Ю. А. Кормишкін, М. М. Корхова, І. В. Смірнова, М. Д. Карпенко

Друкується за рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету від 29.04.2025 р. протокол № 11.

Рецензенти:

- В. В. Гамаюнова – д-р с.-г. наук, професор, завідувачка кафедри землеробства, геодезії та землеустрою, Миколаївський національний аграрний університет
- В. І. Січкарь – д-р біол. наук, професор, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннізнавства та сортовивчення
- Н. В. Іванова – канд. екон. наук, директор ТОВ «Золотий колос», Миколаївського району, Миколаївської області

К 29 **Каталог** сорто-гібридного складу зернових та зернобобових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського національного аграрного університету у 2025 році / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2025. 214 с.
ISBN 978-617-7149-85-8

Каталог містить коротку господарсько-біологічну характеристику сортів та гібридів зернових та зернобобових культур, які випробовувалися на базі Навчального науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету у 2024-2025 рр.

Видання рекомендовано для здобувачів вищої освіти, науковців, суб'єктів насінництва та розсадництва, фахівців АПК, фахівців з рослинництва.

УДК 633.1+633.35(0.83.81):378:63(477.73)

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2025

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	9
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ.....	10
1 Мудрість одеська	11
2 Катруся одеська.....	12
3 Житниця одеська.....	13
4 Октава одеська.....	14
5 Перспектива одеська.....	15
6 Довіра одеська.....	16
7 Відповідь одеська.....	17
8 Оранта одеська.....	18
9 Оптима одеська.....	19
10 Покровська.....	20
11 Основа одеська.....	21
12 Спадщина одеська.....	22
13 Максима одеська.....	23
14 Перемога одеська.....	24
15 Позиція одеська.....	25
16 Вигода одеська.....	26
17 Удача одеська.....	27
18 Добродійка одеська.....	28
19 Господарка одеська.....	29
20 Загадка одеська.....	30
21 Творчість одеська.....	31
22 Богуславка одеська.....	32
23 Наснага одеська.....	33
24 Перепілка одеська.....	34
25 Дачнянка.....	35
26 Палітра.....	36
27 Фортеця.....	37
28 Перевага.....	38
29 Пейзаж.....	39
30 Гейзер.....	40
31 Громада.....	41
32 Вірність одеська.....	42
33 Величава.....	43
34 Вагома.....	44
35 Озоряна.....	45
36 Окраса.....	46
37 Епіграф.....	47
38 Епітет.....	48
39 Етуаль.....	49
40 Сага.....	50
41 Савеліна.....	51

42	Зиск.....	52
43	Дністрянка одеська.....	53
44	Олімпія одеська.....	54
45	Манера одеська.....	55
46	Ягідка одеська.....	56
47	Фаворитка одеська.....	57
48	Королева одеська.....	58
49	Дума одеська.....	59
50	Протекція одеська.....	60
51	Журавка одеська.....	61
52	Злагода одеська.....	62
53	Ліра одеська.....	63
54	Нива одеська.....	64
55	Кришталевий.....	65
56	Золотистий.....	66
57	Прозорий.....	67
58	Янтарний.....	68
59	Лайнер.....	69
60	Алмазний.....	70
61	Шляхетний.....	71
62	Блискучий.....	72
63	Континент.....	73
64	Надійний.....	74
65	Кораловий.....	75
66	Босфор.....	76
67	Бурштин.....	77
68	Гардемарин.....	78
69	Акведук.....	79
70	Гранатовий.....	80
71	Скарб Пальміри.....	81
72	Гордість Пальміри.....	82
73	Русин.....	83
74	Валькірія.....	84
75	Еволюція.....	85
76	Дев'ятий вал.....	86
77	Снігова королева.....	87
78	Сталкер.....	88
79	Вакула.....	89
80	Аватар.....	90
81	Галичанин.....	91
82	Моураві.....	92
83	Таманго.....	93
84	Надійний.....	94
85	Істр.....	95
86	Новий Світанок.....	96
87	Дарунок Степу.....	97

88	Пристань.....	98
89	Світ.....	99
90	Круїз.....	100
91	Білий ангел.....	101
	МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В. М. РЕМЕСЛА НААН.....	102
92	МІП Феєрія.....	103
93	МІП Відзнака.....	104
94	МІП Роксолана.....	105
95	МІП Ніка.....	106
96	МІП Дарій.....	107
97	МІП Янус.....	108
98	МІП Стратег.....	109
99	МІП Атлас.....	110
100	МІП Люкс.....	111
101	МІП Сонячний.....	112
102	МІП Сармат.....	113
103	МІП Богун.....	114
	ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР'ЄВА НААН.....	115
104	Принада.....	116
105	Гармоніка.....	117
106	Мазурок.....	118
107	Мальованка.....	119
108	Мелашка.....	120
109	Малуша.....	121
110	Метелиця харківська.....	122
111	Мізинка.....	123
112	Мавка ІР.....	124
113	Гайок.....	125
114	Вигадка.....	126
115	Проня.....	127
116	Юпітер F1.....	128
117	Сатурн F1.....	129
118	Стоір.....	130
119	МІП Олександра.....	131
120	Дубравка.....	132
121	Оksamит миронівський.....	133
122	МІП Перлина.....	134
	ІНСТИТУТ КЛІМАТИЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НААН.....	135
123	Аквілегія.....	136
124	Росинка.....	137
125	Анатолія.....	138
126	Овідій.....	139

127	Перлина Степу.....	140
128	Марія.....	141
	БІЛОЦЕРКІВСЬКА ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НААН.....	142
129	Відрада.....	143
130	Трембіта білоцерківська.....	144
131	Рось.....	145
132	Муза білоцерківська.....	146
133	Зоря ланів.....	147
134	Розумниця.....	148
135	Зіронька.....	149
136	Легенда Білоцерківська.....	150
137	Добродійка.....	151
138	Грація білоцерківська.....	152
139	Енеїда.....	153
140	Лірика Білоцерківська.....	154
141	Діана білоцерківська.....	155
142	Гадзинка.....	156
143	Либідь.....	157
144	Зорепад білоцерківський.....	158
145	Квітка полів.....	159
	ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН».....	160
146	Землероб.....	161
147	Пирятинка.....	162
148	Вікторія Поліська.....	163
149	Співанка Поліська.....	164
150	Любіто.....	165
151	Кесарія Поліська.....	166
152	Престижна.....	167
153	Пам'яті Гірка.....	168
154	Водограй.....	169
155	Краєвид.....	170
156	Поліська 90.....	171
157	Левітан.....	172
158	Інтенсивне 99.....	173
159	Альдана.....	174
160	Мольфар.....	175
	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БОР».....	176
161	Магнітка.....	177
162	Сталева.....	178
163	Шаховка.....	179
164	Магістраль.....	180
165	Крепиш.....	181
166	Шпалівка.....	182

167	Очаковка.....	183
	ТОВ «ОДЕСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ»	184
168	Пані Оля.....	186
169	Хліб Аріїв.....	187
	ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ».....	188
170	Шамбері.....	189
	ТОВ «VITERRA СІД» (VITERRA SEED).....	190
171	Фелікс.....	191
172	Катаріна.....	192
173	Тіка Така.....	193
174	ЗУ Таррока.....	194
175	Барба.....	195
176	Папіллон.....	196
177	Пітон.....	197
178	Аренія.....	198
	НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ. СЕКЦІЯ «СЕЛЕКЦІЯ» (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)...	199
179	Савант.....	200
180	Нумітор.....	201
181	Одор.....	202
182	Риндуніка.....	203
183	Ніколі.....	204
184	Сцінтея.....	205
	КОМПАНІЯ «ЛІДЕА УКРАЇНА».....	206
185	СОЛІНДО КС.....	207
186	СОРРІАЛ.....	208
187	СОМТЮОЗО КС.....	209
188	СОФРУ.....	210
	СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	211

ПЕРЕДМОВА



За ініціативою ректора Миколаївського національного аграрного університету академіка НААН Шебаніна В'ячеслава Сергійовича було створено науковий полігон з вивчення адаптивних характеристик сучасних сортів зернових культур в умовах Південного Степу України. За 12 років проведено сортовипробування понад 300 сортів зернових колосових культур озимих і ярих форм, які створені селекціонерами Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН; Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН; Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН; Всеукраїнського наукового інституту селекції; Білоцерківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, ННЦ «Інституту землеробства НААН», ФГ «Бор», ТОВ «Одеського селекційного приватного інституту» та інші.

Упродовж останніх років представлено сорти пшениці озимої та ячменю провідних зарубіжних селекційних центрів Німеччини, Франції, Австрії, Чехії, Молдови та інших країн.

Результати сортовипробувань щороку презентуються на Міжнародних Днях поля з технології вирощування зернових колосових культур, які традиційно проводяться наприкінці травня – початку червня для сільгоспвиробників України, наукових та науково-педагогічних працівників аграрних вітчизняних закладів вищої освіти та зарубіжжя, науковців наукових установ НААН. Окрім цього, вчені університету за результатами сортовипробування надають детальний звіт кожному селекційному центру, а для керівників, спеціалістів аграрних підприємств та науковців видається Каталог сорто-гібридного складу зернових і зернобобових культур, представлених на Інноваційному полігоні з трансферу сучасних технологій в АПК Миколаївського національного аграрного університету. Інноваційний полігон з трансферу сучасних технологій в АПК є сучасною базою і для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти та дослідницької роботи аспірантами, докторантами, вченими університету та інших вітчизняних і зарубіжних наукових установ.



**СЕЛЕКЦІЙНО-
ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ -
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАСІННЄЗНАВСТВА ТА
СОРТОВИВЧЕННЯ**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мудрість одеська

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2015 рр.)	4,83
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,15
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	74,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,6)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,7
Сила борошна (W), о.а.	288
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1110
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	напіврозлогий тип кущення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Катруся одеська

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	5,36
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,28
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (7,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	витримує відхилення у строках сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Житниця одеська

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	5,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,90
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	276
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Октава одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,85
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,3
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	42,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	286
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до вирощування по гіршим попередникам
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перспектива одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	4,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 р.)	4,96
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	12,5
Масова частка клейковини, %	25,3
Сила борошна (W), о.а.	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860
Група за якістю	філер
Особливості сорту	витривалість до пізніх строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Довіра одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022, 2024 рр.)	5,18
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,6
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	343
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1150
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витримує пізні та надпізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Відповідь одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,15
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,54
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,1
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	227
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до основних хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Оранта одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,63
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,5
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	41,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,4
Сила борошна (W), о.а.	295
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	потреба в яровизації 20-25 діб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Оптима одеська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	5,98
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,58
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посуhostійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,6)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,8
Сила борошна (W), о.а.	322
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	стійкий до екстремальних умов посухи
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Покровська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,94
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,53
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	пластичний до ранніх та пізніх строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Основа одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,44
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	303
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витримує пізні та надпізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Спадщина одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,98
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,32
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	78,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	6,5
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,3
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	298
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока продуктивна кущистість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Максима одеська

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,92
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,20
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	96,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,0
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	320
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	позитивно реагує на зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перемога одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,42
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,53
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,0
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	279
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу, висока позитивна реакція на внесення азотних добрив
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Позиція одеська

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,23
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,9
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	328
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	висока стабільність за реакцією на контрастні строки і норми висіву
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вигода одеська

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,52
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	278
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	має підвищену ефективність позакореневого підживлення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Удача одеська

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,64
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2022-2024 рр.)	5,47
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	94,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,4
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	26,7
Сила борошна (W), о.а.	313
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	підвищена потреба в яровизації (50-55 діб)
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Добродійка одеська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,66
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2022-2024 рр.)	5,79
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	96,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	низька(4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	339,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	975
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	толерантний до високого інфекційного навантаження
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Господарка одеська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	5,62
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	336
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	виражена адаптивність до факторів змін клімату
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Загадка одеська

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	5,73
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,9
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	305,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Творчість одеська

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	6,98
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	5,12
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,4
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (5,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,8
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	278
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	має напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Богуславка одеська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,02
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	99,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	нижче середня (5,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,4
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	282
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	895
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	придатний для сівби по попереднику соняшник
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Наснага одеська

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2015 рр.)	6,45
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2023 рр.)	6,31
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	69,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1120
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до вирощування в умовах зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перепілка

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	5,48
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,16
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	придатний до вирощування в умовах зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Дачнянка

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	4,73
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,38
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	9,0
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	9,0
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	середня (6,0)
Маса 1000 зерен, г	35,6
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	220
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	витривалий до низьких агрофонів
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Палітра

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	4,80
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,56
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	220
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	підвищене кущення
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фортеця

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	4,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,19
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	70,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витримує пізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перевага

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,33
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,97
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу з підвищеною стійкістю до екстремальних умов
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пейзаж

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,62
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	71,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гейзер

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,49
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,28
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,3)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	302
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Громада

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,25
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,19
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	316
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до використання по непарових попередниках на середніх агрофонах
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вірність одеська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	7,10
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,55
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	95,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	266,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1025
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Величава

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,65
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,40
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	26,0
Сила борошна (W), о.а.	291
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вагома

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,57
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	89,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,7
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	26,4
Сила борошна (W), о.а.	423
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Озоряна

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	7,51
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2023-2024 рр.)	5,58
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,6
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,3
Сила борошна (W), о.а.	355
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	985
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	має прямостоячий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Окраса

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,32
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2023-2024 рр.)	5,82
Група за висотою	ранньостиглий
Середня висота рослин (см)	91,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,6
Сила борошна (W), о.а.	271
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	955
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу, потребує сівби по кращих попередниках
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Епіграф

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,27
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,12
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	дуже висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	278,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	пряма форма куща
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Епітет

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,03
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,53
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	272
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,4
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	295,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Етуаль

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,08
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,37
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,3
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	307,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Сага

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,10
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	91,9
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,7)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	25,5
Сила борошна (W), о.а.	270,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	прямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Савеліна

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,21
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	94,3
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,8
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,3
Сила борошна (W), о.а.	278,0
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зиск

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білі
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	4,84
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,27
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	74,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,1
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	306
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Дністрянка одеська

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,20
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,9
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	288,0
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Олімпія одеська

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,21
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,4
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,3)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,7
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	24,6
Сила борошна (W), о.а.	268,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	прямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Манера одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	5,60
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,33
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	40,5
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,5
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	скоростиглість у поєднанні з високою продуктивністю
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ягідка одеська

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	5,94
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	91,9
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,7)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	12,6
Масова частка клейковини, %	24,7
Сила борошна (W), о.а.	248,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фаворитка одеська

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	5,97
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,5
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,3)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,1
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	25,9
Сила борошна (W), о.а.	286
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напіврозлогий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Королева одеська

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,17
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,3
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,7)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,4
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	24,4
Сила борошна (W), о.а.	304,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	740
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	прямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Дума одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,39
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	79,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	268
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	висока позитивна реакція на азотні добрива
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Протекція одеська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,93
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2023 р.	7,29
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	95,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	нижче середнього (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	266,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1025
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівпрямий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Журавка одеська

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2009-2010 рр.)	7,62
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022 рр.)	5,51
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,3
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Посуhostійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	висока (8,3)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	29,5
Сила борошна (W), о.а.	380
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1460
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Злагода одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,25
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,3
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,9
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1150
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	придатний для умов зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ліра одеська

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2013 рр.)	5,17
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022 рр.)	5,40
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	76,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,4
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	30,6
Сила борошна (W), о.а.	411
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1140
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	позитивна реакція на підвищене азотне живлення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Нива одеська

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	4,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2021 рр.)	5,47
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	29,9
Сила борошна (W), о.а.	339
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Кришталевий

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сорто випробування (2021-2022 рр.)	5,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,84
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	85,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,6
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Золотистий

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сорто випробування (2021-2022 рр.)	5,69
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2023-2024 рр.)	4,11
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	88,9
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Масова частка білку, %	13,6
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	прямостоячий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Прозорий

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,81
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2021 рр.)	4,16
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	вище середнього (6,2)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осіпання (бал)	висока (8,7)
Полягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середнього (7,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,5
Масова частка білку, %	14,4
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Янтарний

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2023-2024 рр.)	3,74
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,7
Масова частка білку, %	12,6
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Лайнер

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сорто випробування (2016-2017 рр.)	4,65
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2021, 2023 рр.)	4,52
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,9)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	45,4
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Алмазний

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	3,27
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	94,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,3)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	47,0
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Шляхетний

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,74
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,88
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	79,5
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	низька (3,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,3)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,3)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,6
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Блискучий

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	4,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,00
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,9)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	44,2
Масова частка білку, %	13,5
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Континент

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,98
Середня урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 р., 2021 р., 2024 р.)	4,31
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,8)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	42,8
Масова частка білку, %	14,3
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Надійний

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	4,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,05
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,9)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	44,2
Масова частка білку, %	13,5
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Кораловий

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сорто випробування (2017-2018 рр.)	4,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,49
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	72,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,7
Масова частка білку, %	12,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Босфор

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2009-2011 рр.)	6,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2015-2020 рр.)	4,92
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	287
Зимостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,7)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,9)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	14,2
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Бурштин

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2005-2007 рр.)	6,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021 р.	4,91
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня(5,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	13,5
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	потреба в яровизації 20-25 діб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Гардемарин

Рік реєстрації	2006
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2004-2006 рр.)	6,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2017, 2021 рр.	5,35
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	277
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	15,7
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Акведук

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	3,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021 рр.	4,71
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	70,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	Вище середнього (6,8)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Полягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	42,4
Масова частка білку, %	14,6
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	високостійкий до вилягання
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Гранатовий

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	3,37
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	85,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	низька (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,6
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Скарб Пальміри

Рік реєстрації	2020
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	3,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,85
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	73,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	251
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,5
Масова частка білку, %	13,5
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Гордість Пальміри

Рік реєстрації	2020
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>coeleste</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	гола
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	2,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,62
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	67,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	251
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	15,2
Напрямок використання	харчовий
Тип розвитку	дворучка
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Русин

Рік реєстрації	2023
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) рослин озимого типу розвитку за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	6,16
Середня урожайність (т/га) рослин ярого типу розвитку за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	2,06
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,03
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	84,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	44,2
Масова частка білку, %	11,9
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	наявне антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Валькірія

Рік реєстрації	2018
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	5,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,56
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	77,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	249
Зимостійкість (бал)	висока (8,6)
Морозостійкість (бал)	4,0
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспору (бал)	висока (7,2)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,6
Масова частка білку, %	11,7
Напрямок використання	зерновий
Тип розвитку	дворучка
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Еволюція

Рік реєстрації	2023
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) рослин озимого типу розвитку за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	5,99
Середня урожайність (т/га) рослин озимого типу розвитку за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	3,86
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	3,99
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	73,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,0)
Внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	11,5
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Дев'ятий вал

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	5,34
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,98
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	90,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	249
Зимостійкість (бал)	вище середня (6,9)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осіпання (бал)	висока (8,6)
Полягання (бал)	висока (7,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білку, %	12,5
Напрямок використання	зерновий
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Снігова королева

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	5,38
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	4,38
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	69,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	252
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	12,0
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Сталкер

Рік реєстрації	1997
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (1995-1997 рр.)	6,14
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,57
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	81
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	середня (5,0)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	50,0
Вирівняність зерна, %	98,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Вакула

Рік реєстрації	2003
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2000-2003 рр.)	5,80
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022, 2024 рр.)	3,42
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	90,0
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,0
Вирівняність зерна, %	98,0
Масова частка білку, %	12,9
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	знижена фотоперіодична чутливість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Аватар

Рік реєстрації	2014
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	3,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,43
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	58,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	80
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	45,3
Вирівняність зерна, %	96,0
Масова частка білку, %	13,2
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Галичанин

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>ricotense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	гладенькі
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	3,40
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022, 2024 рр.)	3,61
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	52,8
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	81
Посухостійкість (бал)	вище середнього (6,8)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,2)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Вирівняність зерна, %	89,8
Масова частка білку, %	14,0
Напрямок використання	фуражний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Моураві

Рік реєстрації	2018
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2018 рр.)	2,69
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,32
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	62,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	83
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,4)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,7)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Вирівняність зерна, %	90,6
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Таманго

Рік реєстрації	2019
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	2,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022, 2024 рр.)	3,89
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	55,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	83
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Вирівняність зерна, %	93,0
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	дуже сильне антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Надійний

Рік реєстрації	2020
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	2,62
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	3,20
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	61,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньо стеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,1
Вирівняність зерна, %	93,2
Масова частка білку, %	12,3
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб і шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Істр

Рік реєстрації	2021
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	4,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2022, 2024 рр.)	3,23
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	79,5
Група стиглості	середньопізній
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,8
Вирівняність зерна, %	92,9
Масова частка білку, %	12,9
Вирівняність зерна, %	91
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напіврозлогий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Новий Світанок

Рік реєстрації	2022
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2022 рр.)	4,14
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2022, 2024 рр.)	3,29
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	76,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	86
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середнього (6,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,8
Вирівняність зерна, %	92,9
Масова частка білку, %	12,9
Вирівняність зерна, %	92,9
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напіврозлогий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ГОРОХ ПОСІВНИЙ (ЗЕРНОВИЙ)

сорт Дарунок Степу

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>seminatum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насінневого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	3,29
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2024 р.)	3,07
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,9
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	78
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осипання (бал)	висока (8,1)
Вилягання (бал)	середня (6,3)
Придатність до механізованого збирання, бал	середня (7,2)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	46,3
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,7)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (8,6)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	227,8
Масова частка білку, %	24,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	безлисточковий, рекомендована норма висіву 1,2-1,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ГОРОХ ПОСІВНИЙ (ЗЕРНОВИЙ)

сорт Пристань

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>seminatum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насінневого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	3,25
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2024 р.)	3,02
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	91,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	82
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (7,7)
Вилягання (бал)	нижче середня (4,4)
Придатність до механізованого збирання, бал	середня (5,5)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	54,5
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,7)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	215,9
Масова частка білку, %	24,7
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	безлисточковий, рекомендована норма висіву 1,2-1,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ГОРОХ ПОСІВНИЙ (ЗЕРНОВИЙ)

сорт Світ

Рік реєстрації	2006
Різновидність	<i>seminatum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насінневого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2004-2006 рр.)	3,32
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2024 р.)	2,99
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	50,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	82
Посухостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Придатність до механізованого збирання (бал)	
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	230,0
Масова частка білку, %	24,1
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	безлисточковий, рекомендована норма висіву 1,3-1,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ГОРОХ ПОСІВНИЙ (ЗЕРНОВИЙ)

сорт Круїз

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>seminatum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насінневого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	2,11
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2024 р.)	3,09
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	78
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осипання (бал)	висока (8,4)
Вилягання (бал)	вище середня (6,9)
Придатність до механізованого збирання, бал	висока (7,8)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	56,6
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,7)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	202,0
Масова частка білку, %	23,7
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	безлисточковий, рекомендована норма висіву 1,3-1,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ГОРОХ ПОСІВНИЙ (ЗЕРНОВИЙ)

сорт Білий ангел

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>seminatum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насінневого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	2,50
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2024 р.)	3,03
Група за висотою	напівкарлик
Середня висота рослин (см)	68,3
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	80
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	вище середня (6,0)
Придатність до механізованого збирання, бал	середня (7,2)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	46,3
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	227,8
Масова частка білку, %	24,4
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	безлисточковий, рекомендована норма висіву 1,2-1,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

**МИРОНІВСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ
В. М. РЕМЕСЛА НААН**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МП Феєрія

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,65
Урожайність в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,49
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	низька (3,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,5
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	253,8
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МІП Відзнака

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	7,15
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	94,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,6
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	26,9
Сила борошна (W), о.а.	279,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МІП Роксолана

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,53
Урожайність в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,64
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,0
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	242,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	976,7
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МІП Ніка

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	5,54
Урожайність в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,50
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	95,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,2
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	206
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт МІП Дарій

Рік реєстрації	2018
Підвид	шестирядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	4,11
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	73,4
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока 9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,1
Масова частка білку, %	12,2
Напрямок використання	на зерно
Тип розвитку	озимий
Особливості сорту	помірне антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт МІП Янус

Рік реєстрації	2024
Підвид	шестирядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,71
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	98,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	245
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	на зерно
Тип розвитку	озимий
Особливості сорту	слабке антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт МІП Стратег

Рік реєстрації	2024
Підвид	шестирядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	7,61
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	88,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	242
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,4
Масова частка білку, %	10,8
Напрямок використання	на зерно
Тип розвитку	озимий
Особливості сорту	слабке антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт МІП Атлас

Рік реєстрації	2024
Підвид	шестирядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	7,11
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	95,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	244
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	48,0
Масова частка білку, %	10,8
Напрямок використання	на зерно
Тип розвитку	озимий
Особливості сорту	дуже слабке антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт МІП Люкс

Рік реєстрації	2020
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,22
Урожайність в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	3,11
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	62,7
Група стиглості	пізньостиглий
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,8
Масова частка білку, %	12,4
Вирівняність зерна, %	90,1
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	ярий
Особливості сорту	наявне антоціанове забарвлення кінчиків остюків
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт МІП Сонячний

Рік реєстрації	2024
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	4,14
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	59,0
Група стиглості	пізньостиглий
Вегетаційний період, діб	87
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспору (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	45,4
Масова частка білку, %	13,4
Вирівняність зерна, %	95,9
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	ярий
Особливості сорту	напівпряме положення колоса у просторі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт МІП Сармат

Рік реєстрації	2024
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	4,47
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	карлики
Середня висота рослин (см)	58,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	87
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,6
Масова частка білку, %	13,2
Вирівняність зерна, %	96,7
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	ярий
Особливості сорту	горизонтальне положення колоса у просторі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт МІП Богун

Рік реєстрації	2017
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	2,61
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	62,1
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	87
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспору (бал)	висока (8,4)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,6
Масова частка білку, %	12,1
Вирівняність зерна, %	93,9
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	ярий
Особливості сорту	горизонтальне положення колоса у просторі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся



ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР'ЄВА НААН



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Принада

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,60
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,35
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	79,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вищесередня
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,5
Сила борошна (W), о.а.	317
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гармоніка

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 р.)	5,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2022, 2024 рр.)	4,80
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,8
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	262
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мазурок

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,92
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2023-2024 рр.	6,01
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	93,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	174
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	пряма форма куща
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мальованка

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	6,41
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,78
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	нижче середньої (5,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	303
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	945
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	форма куща пряма
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мелашка

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	6,26
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,91
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	103,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (5,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Малуша

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,37
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	274
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,3
Масова частка білку, %	13,1
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	239,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	815
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Метелиця харківська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2020 р.)	4,43
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2022, 2024 рр.)	5,47
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	77,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,1
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	210
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мізинка

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,36
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої та твердої сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	13,1
Масова частка клейковини, %	26,3
Сила борошна (W), о.а.	268,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мавка ІР

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2021 рр.)	5,97
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2023-2024 рр.	5,90
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	89,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	35,8
Масова частка білку, %	13,1
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гайок

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2024 рр.)	5,31
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	78,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вигадка

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,28
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020-2024 рр.)	5,14
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,3
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	245
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830
Група за якістю	філер
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Проня

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	4,99
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,45
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	94,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Посухостійкість (бал)	висока (7,2)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,8
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	27,6
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЖИТО ПОСІВНЕ ОЗИМЕ

гібрид Юпітер F1

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>vulgare</i>
Рослина: плоїдність	диплоїд
Рослина: габітус	напівпрямостоячий
Колос: сизий наліт	сильний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	6,37
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	127,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Морозо- та Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	вище середня (6,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	29,7
Масова частка білку, %	11,3
Число падіння, с	226
Придатність до механізованого збирання, бал	7,9
Напрямок використання	Зерновий, на крупу
Особливості сорту	рекомендована норма висіву 3,0 млн схожих зерен на 1 га
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЖИТО ПОСІВНЕ ОЗИМЕ

гібрид Сатурн F1

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>vulgare</i>
Рослина: плоїдність	диплоїд
Рослина: габітус	напівпрямостоячий
Колос: сизий наліт	помірний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	6,21
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	131,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Морозо- та Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	30,5
Масова частка білку, %	10,4
Число падіння, с	179
Придатність до механізованого збирання, бал	8,0
Напрямок використання	Зерновий, на крупу
Особливості сорту	рекомендована норма висіву 3,0 млн схожих зерен на 1 га
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЖИТО ПОСІВНЕ ОЗИМЕ

сорт Стоір

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>vulgare</i>
Рослина: плоїдність	диплоїд
Рослина: габітус	напівпрямостоячий
Колос: сизий наліт	слабкий
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2013 рр.)	4,85
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	117,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	268,6
Морозо- та Зимостійкість (бал)	дуже висока (8,3)
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,9)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	32,3
Масова частка білку, %	10,4
Число падіння, с	220
Придатність до механізованого збирання, бал	8,0
Напрямок використання	Зерновий
Особливості сорту	рекомендована норма висіву 4,0 млн схожих зерен на 1 га
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт МП Олександра

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2019 р.)	2,36
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	66,4
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	26,0
Сила борошна (W.o.a)	280
Об'єм хліба, мл	1100
Група за якістю	цінна
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок - відсутнє
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт Дубравка

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 р.)	2,18
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	70,1
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	88
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,3)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,1)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	висока (8,7)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,1)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,6)
Маса 1000 зерен, г	31,9
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,9
Сила борошна (W.o.a)	280
Об'єм хліба, мл	1080
Група за якістю	сильна
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	рослини зі зігнутим прапорцевим листком
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт Оксамит миронівський

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 р.)	2,44
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	76,8
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	88
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,1)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	висока (8,7)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,1)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,1)
Маса 1000 зерен, г	35,5
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	29,0
Сила борошна (W.o.a)	260
Об'єм хліба, мл	1010
Група за якістю	цінна
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	має напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

сорт МІП Перлина

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	світло-коричневе
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2023-2024 р.)	3,22
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	79,9
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	89
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,5
Масова частка білку, %	15,4
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	має напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп



**ІНСТИТУТ КЛІМАТУ ІС
ОРІЄНТОВАНОГО
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА НААН**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Аквілегія

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,51
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021 р.	5,72
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,6
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,4
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1130
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Росинка

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2005-2007 рр.)	6,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021 рр.	5,36
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	96,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	36,8
Сила борошна (W), о.а.	312
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1320
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Анатолія

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2014-2015 рр.)	5,29
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2023 рр.	6,11
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	має прямостоячий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Овідій

Рік реєстрації	2009
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2007-2009 рр.)	5,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021 рр.	5,59
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	30,5
Сила борошна (W), о.а.	209
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1350
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перлина Степу

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	4,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021 р.	6,13
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,8
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,9
Масова частка білку, %	14,8
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	305
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Марія

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2013 рр.)	5,30
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021 рр.	5,47
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	30,2
Сила борошна (W), о.а.	338
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ



**БІЛОЦЕРКІВСЬКА ДОСЛІДНО-
СЕЛЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ
ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ
КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
НААН**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Відрада

Рік реєстрації	2010
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2008-2010 рр.)	7,56
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,39
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,2)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,0
Масова частка білку, %	19,2
Масова частка клейковини, %	44,5
Сила борошна (W), о.а.	649
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1450
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Трембіта білоцерківська

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2022-2023 рр.)	7,23
В ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	97,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	274
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої та летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	790
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	кущ напівпрямий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Рось

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	3,66
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,01
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	12,8
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	227
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	770
Група за якістю	філер
Особливості сорту	прямий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Муза білоцерківська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2022, 2024 рр.	4,87
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	274
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зоря ланів

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,17
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2021-2022, 2024 рр.)	4,86
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,6
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,9
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Розумниця

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	4,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,55
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,9
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	пряmostоячий куш, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зіронька

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,23
В ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,9
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	пряmostоячий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Легенда Білоцерківська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,16
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,45
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (7,6)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,2)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	308
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	добре реагує на підвищені дози мінеральних добрив
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Добродійка

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,36
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,41
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	106,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,1
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	156
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Грація білоцерківська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,42
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2022, 2024 рр.	5,25
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	89,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напіврозлогий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Енеїда

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,28
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	4,87
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	106,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білку, %	14,5
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	179
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ, майже відсутній восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Лірика білоцерківська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,14
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021-2024 рр.	5,60
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	205
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	філер
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Діана білоцерківська

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,01
В ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	низька (2,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	нижче середня (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	14,5
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	327,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	сильні
Особливості сорту	має напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гадзинка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,84
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,17
Група за висотою	високорослі
Середня висота рослин (см)	105,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,2
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ, помірний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Либідь

Рік реєстрації	2006
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2004-2006 рр.)	7,82
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021рр. і 2023-2024 рр.	5,48
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	274
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	319
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1240
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зорепад білоцерківський

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	біле
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,04
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,0
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	245
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	філер
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Квітка полів

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 рр.	5,45
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,8)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся



ІНЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Землероб

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,42
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,22
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	115,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	нижче середня (5,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	202
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий куш
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пирятинка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,12
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021, 2024 рр.	5,31
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	99,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	230
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вікторія Поліська

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,24
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2024 р.	5,51
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	100,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,7)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,7
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	250
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Співанка Поліська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	5,53
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,45
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	89
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Любіто

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	6,32
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021-2023 рр.	6,09
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	117,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,8
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	30,0
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	875
Група за якістю	філер
Особливості сорту	помірний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кесарія Поліська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,32
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,06
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	159
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900
Група за якістю	філер
Особливості сорту	дуже велика кількість рослин із зігнутих прапорцевих листком
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Престижна

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2016 рр.)	4,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2021 рр.	5,92
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	91,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,3
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	219
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	760
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пам'яті Гірка

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,25
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 р.	5,75
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	192
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість та зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Водограй

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	5,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,27
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	219
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напівпрямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Краєвид

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2011-2013 рр.)	5,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 рр.	5,66
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,0
Група стиглості	сереньостиглий
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (7,3)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,2
Сила борошна (W), о.а.	315
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	прямостоячий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Поліська 90

Рік реєстрації	1994
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (1992-1994 рр.)	5,90
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 рр.	4,71
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	103,0
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	282
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,7)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	50,0
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,0
Сила борошна (W), о.а.	380
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	посухо та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЖИТО ПОСІВНЕ (ОЗИМЕ)

сорт Левітан

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: положення у просторі	напівпохиле
Колос: сизий наліт	дуже сильний
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле
Рослина: габітус	прямий
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	6,18
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ середнє за 2020, 2023 рр.	5,33
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	133
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	279
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	11,0
Число падіння, с	151
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	диплоїд
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЖИТО ПОСІВНЕ (ОЗИМЕ)

сорт Інтенсивне 99

Рік реєстрації	2002
Різновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: положення у просторі	похиле
Колос: сизий наліт	помірний
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне
Рослина: габітус	прямостоячий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (1998-2000 рр.)	3,49
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ середнє за 2024 р.	3,12
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	111,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	середня (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	середня (6,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,7
Масова частка білку, %	12,6
Число падіння, с	304
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	диплоїд
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЖИТО ПОСІВНЕ (ОЗИМЕ)

сорт Альдана

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: положення у просторі	похиле
Колос: сизий наліт	помірний
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне
Рослина: габітус	прямостоячий
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	7,78
В ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	135,1
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	276
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	нижче середня (4,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до снігової плісняви (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	середня (6,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	1,3
Маса 1000 зерен, г	39,2
Масова частка білку, %	12,6
Число падіння, с	189,7
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	диплоїд
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся


ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

сорт Мольфар

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>ferrugineum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: остюки	наявні
Колос: колір	червоний
Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке
Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке
Зернівка: за кольором	коричнева
Колос: положення у просторі	пониклий
Колос: сизий наліт	помірний
Колос: за формою	пірамідальний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	6,40
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2023 р.	6,21
Група за висотою	низька
Середня висота рослин (см)	109,1
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,7)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	14,9
Маса 1000 зерен, г	42,8
Масова частка білку, %	14,4
Число падіння, с	151
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	гексаплоїд
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп



ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БОР»



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Магнітка

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2019 рр.)	4,61
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021-2023 рр.	6,30
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Сталева

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,43
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 рр.	5,67
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	короткий період яровизації (20 діб)
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Шаховка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021-2024 рр.	5,39
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,8
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Магістраль

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2014 рр.)	4,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2023 рр.	6,01
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,0
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,8)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	вище середня (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (7,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	14,3
Масова частка клейковини, %	28,9
Сила борошна (W), о.а.	299
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1170
Група за якістю	сильна
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	пряmostoячий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Крепиш

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,33
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ середнє за 2021 і 2023-2024 рр.	5,62
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	195
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Шпалівка

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,16
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2023 рр.	6,51
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (7,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,2
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1040
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	кущ прямий, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Очаковка

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2020-2021 рр.)	5,30
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021-2024 рр.	5,38
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,8
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посуhostійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	підвищена (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	підвищена (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	206
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ТОВ «ОДЕСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ»



Контактний телефон для наукового
супроводу вирощування сортів
селекції ОСПІ: **+380 50 316 6899**

БАБАЯНЦ ОЛЬГА ВАДИМІВНА

науковий консультант ОСПІ, доктор біологічних наук



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА


сорт Пані Оля

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	5,81
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	5,70
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,4
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,8
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,3
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінна
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Хліб Аріїв

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,94
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2023-2024 рр.	6,15
Група за висотою	напівкарликові
Середня висота рослин (см)	72,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,6
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,7
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	має напівпрямую форму куща
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся



Д · О · Б · Р · Е
УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ

ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ»



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Шамбері

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2023-2024 рр.)	6,60
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,2
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (7,3)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	12,8
Масова частка клейковини, %	25,6
Сила борошна (W), о.а.	249
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	прямий кущ
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся



**ТОВ «ВІТЕРРА СІД»
(VITERRA SEED)**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фелікс

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2018 рр.)	5,50
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020-2024 рр.	5,09
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	72,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	328
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	посухостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Катаріна

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2017 рр.)	4,86
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018-2024 рр.	5,02
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	58,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Тіка Така

Рік реєстрації	2021
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2021 рр.)	5,16
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2022-2024 рр.	6,58
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	77,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	низька (3,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	36,9
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	28,9
Сила борошна (W), о.а.	231
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890
Група за якістю	філер
Особливості сорту	високий коефіцієнт кущення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт 3У Таррока

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	вище середня (7,0)
Маса 1000 зерен, г	48,0
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	262
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1021
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	напівпрямий кущ, рекомендована норма висіву 3,5-4,0 млн схожих зерен на 1 га
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Барба

Рік реєстрації	2023
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	73,5
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,0
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	30,0
Сила борошна (W), о.а.	236
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	раннє відновлення весняної вегетації, сильне кущення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Папіллон

Рік реєстрації	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	77,9
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	47,1
Масова частка білку, %	13,1
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	283
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	981
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	пластичний до строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пітон

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020)	4,93
Урожайність в ННПЦ МНАУ у 2021р.	6,29
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	65,4
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (4,3)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	36,0
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	290
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока кущистість, пластичний до строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Аренія

Рік реєстрації	2020
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	5,35
В ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	76,9
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	250
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,2
Масова частка білку, %	12,5
Тип розвитку	озимий
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	рекомендована норма висіву насіння – 3,3-3,4 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Полісся

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ. СЕКЦІЯ
«СЕЛЕКЦІЯ» (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Савант

Рік реєстрації в Республіці Молдова	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень в умовах Бельцького Степу:	
Генетичний потенціал сорту – 8,60 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	97,0
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	вище середня (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	9,0 (висока)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	8,0 (висока)
Стійкість до бурої іржі (бал)	7,0 (вище середня)
Стійкість до фузаріозу (бал)	6,0 (середня)
Стійкість до клопа-черепашки (%)	8,0 (висока)
Маса 1000 зерен, г	32,7
Масова частка білка, %	11,7
Масова частка клейковини, %	27,0
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівінтенсивного типу, рекомендується для вирощування на бідних та середніх агрофонах з нормою висіву 4,5-5,0 млн схожих насінин на 1 га.
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Нумітор

Рік реєстрації в Республіці Молдова	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень в умовах Бельцького Степу:	
Генетичний потенціал сорту – 8,70 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,0
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	середня (6,8)
Осипання (бал)	висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	середня (6,0)
Стійкість до клопа-черепашки (%)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білка, %	11,9
Масова частка клейковини, %	27,0
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства, рекомендована норма висіву 5,0-5,5 млн схожих насінин на 1 га
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Одор

Рік реєстрації в Республіці Молдова	2024
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень в умовах Бельцького Степу:	
Генетичний потенціал сорту – 8,70 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	вище середня (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	середня (6,0)
Стійкість до клопа-черепашки (%)	5,5 (середня)
Маса 1000 зерен, г	37,0
Масова частка білка, %	12,5
Масова частка клейковини, %	23,5-31,1
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівінтенсивного типу, рекомендована норма висіву насіння 4,5-5,0 млн шт./га
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Риндуніка

Рік реєстрації в Республіці Молдова	Знаходиться в ДСВ
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень в умовах Бельцького Степу:	
Генетичний потенціал сорту – 8,70 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (%)	-
Стійкість до клопа-черепашки (%)	-
Маса 1000 зерен, г	36,5
Масова частка білка, %	10,2-14,5
Масова частка клейковини, %	23,8-30,8
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	напівінтенсивного типу, рекомендована норма висіву 4,5-5,0 млн схожих насінин на 1 га.
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

Сорт Ніколі

Рік реєстрації в Республіці Молдова	2024
Різновидність	pallidum
Ознаки різновидності:	
Колос: остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	солом'яний
Остюки: колір	солом'яний
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	солом'яний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Генетичний потенціал в зоні Бельцького Степу (2021-2023 рр.) 5,150 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	234
Зимостійкість (бал)	5,0
Морозостійкість (бал)	5,0
Посухостійкість (бал)	5,0
Осіпання (бал)	5,0
Вилягання (бал)	5,0
Стійкість до борошнистої роси (бал)	5-8
Стійкість до бурі іржі (бал)	4-6
Стійкість до фузаріозу (бал)	-
Стійкість до мухи шведської (%)	-
Стійкість до клопа-черепашки (%)	-
Особливості сорту	висока пластичність та стабільність
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

сорт Сцінтея

Рік реєстрації в Республіці Молдова	2016
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	солом'яний
Остюки: колір	солом'яний
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	солом'яний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Генетичний потенціал в зоні Бельцького Степу (2021-2023 рр.) – 4,73 т/га	
На дослідному полі МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	241
Зимостійкість (бал)	5,0
Морозостійкість (бал)	5,0
Посухостійкість (бал)	5,0
Осіпання (бал)	5,0
Вилягання (бал)	5,0
Стійкість до борошнистої роси (бал)	6-8
Стійкість до бурі іржі (бал)	5-7
Стійкість до фузаріозу (бал)	-
Стійкість до мухи шведської (%)	-
Стійкість до клопа-черепашки (%)	-
Особливості сорту	висока пластичність та стабільність
Географічні та зонові рекомендації	Степ



Lidea

**КОМПАНІЯ
«ЛІДЕА УКРАЇНА»**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОЛІНДО КС

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	7,36
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (1,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,1
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОРРІАЛ

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,40
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021 р.	6,16
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	60,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	318
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	висока якість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОНТЮОЗО КС

Рік реєстрації	2022
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2021-2022 рр.)	7,21
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить польові випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,4
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820
Група за якістю	філер
Особливості сорту	напіврозлогий кущ, сильний восковий наліт на колосі
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОФРУ

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2019-2020 рр.)	4,37
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2021 р.	6,00
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	62,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,0
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	307
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Каталог сорто-гібридного складу зернових та зернобобових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського національного аграрного університету у 2024 році / уклад. Гадзало Я. М., Шебанін В. С., Соколов В. М. та ін. Миколаїв : МНАУ, 2024. 212 с.
2. Каталог озимі зернові - VITERRA SEED / Київ : ТОВ «VITERRA СІД», 2021. 15 с.
3. Каталог сортів і гібридів польових культур. / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва / Кобизєва Л. Н., Буряк Ю. І. Коломацька В. П. та ін. ІР ім. В. Я. Юр'єва : Харків, 2021. 192 с.
4. Каталог сортів та гібридів : науково-методичні рекомендації. Литвиненко М. А., Лифенко С. П., Наконечний М. Ю та ін. / за ред. Соколова В. М. Одеса : СГІ - НЦНС, 2020. 176 с.
5. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 1. 784 с.
6. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 2. 395 с.
7. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 4. 183 с.
8. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 5. 395 с.
9. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 6. 705 с.
10. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. Вип 1. 1088 с.
11. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. Вип 2. 372 с.
12. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип 1. 913 с.
13. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип 2. 536 с.
14. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. Вип 2. 970 с.
15. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. Вип 3. 237 с.
16. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України, Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. Вип 1. 1090 с.
17. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип 3. 87 с.

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

Довідкове видання

КАТАЛОГ СОРТО-ГІБРИДНОГО СКЛАДУ
ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА
ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ МИКОЛАЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2025 РОЦІ

Авторський колектив:

Гадзало Ярослав Михайлович
Шебанін В'ячеслав Сергійович
Решетілов Георгій Олександрович та ін.

Комп'ютерна верстка: І. В. Смірнова

Формат 60×84 1/16. Ум. друк арк. 13,38
Тираж 300 прим. Зам. № __

Надруковано у видавничому відділі
Миколаївського національного аграрного університету
54008, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.

