

**КАТАЛОГ СОРТІВ
ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР,
ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ
ПОЛІГОНІ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2021 РОЦІ**

Миколаїв
2021

УДК 633.1+633.35(0.83.81):378:63(477.73)

К 29

Авторський колектив:

Я. М. Гадзало, В. С. Шебанін, Р. А. Вожегова, В. М. Соколов, Кормишкін
Ю. А., О. А. Димидов, Л. Н. Кобизєва, В. Ф. Камінський, Н. П. Артюшенко,
М. Ф. Парій, М. В. Бузинний, О. А. Тарасенко, В. П. Ратушняк, О. Є. Новіков,
М. М. Корхова, М. Д. Карпенко

Друкується за рішенням вченої ради Миколаївського національного
аграрного університету від 22.04.2021 р. протокол № 9

Рецензенти:

- В. В. Гамаюнова – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства,
геодезії та землеустрою, Миколаївський національний
аграрний університет
- С. В. Коковіхін – д-р с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи, Інститут зрошуваного землеробства НААН України
- Н. В. Іванова - канд. екон. наук, директор ТОВ «Золотий колос» ,
Вітовського району, Миколаївської області

Каталог сортів зернових та зернобобових культур, представлених
К 29 на демонстраційному полігоні Миколаївського національного
аграрного університету у 2021 році / Міністерство освіти і науки
України; Миколаївський національний аграрний університет.
Миколаїв : МНАУ, 2021. 224 с.

Каталог містить коротку господарсько-біологічну характеристику сортів
зернових та зернобобових культур, які випробовувались на базі Навчального
науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного
університету у 2020-2021 рр.

Видання розраховане для здобувачів вищої освіти, науковців, суб'єктів
насінництва та розсадництва, фахівців АПК, фахівців з рослинництва.

УДК 633.1+633.35(0.83.81):378:63(477.73)

ISBN 978-617-7149-55-1

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2021

ЗМІСТ

1	СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ.....	8
2	Антонівка.....	9
3	Благодарка одеська	10
4	Ліра одеська.....	11
5	Журавка одеська.....	12
6	Нива одеська.....	13
7	Щедрість одеська.....	14
8	Мудрість одеська.....	15
9	Гарантія одеська.....	16
10	Катруся одеська.....	17
11	Кантата одеська.....	18
12	Оранта одеська.....	19
13	Житниця одеська.....	20
14	Нота одеська.....	21
15	Октава одеська.....	22
16	Ліга одеська.....	23
17	Дума одеська.....	24
18	Оптима одеська.....	25
19	Родзинка одеська.....	26
20	Манера одеська.....	27
21	Досконалість одеська.....	28
22	Версія одеська.....	29
23	Перспектива одеська.....	30
24	Спадщина одеська.....	31
25	Покровська.....	32
26	Довіра одеська.....	33
27	Злагода одеська.....	34
28	Відповідь одеська.....	35
29	Основа одеська.....	36
30	Перемога одеська.....	37
31	Годувальниця одеська.....	38
32	Литанівка.....	39
33	Мелодія одеська.....	40
34	Аксіома одеська.....	41
35	Зиск.....	42
36	Пилипівка.....	43
37	Обряд.....	44
38	Перепілка.....	45
39	Гурт.....	46
40	Ветеран.....	47
41	Наснага.....	48

42	Сториця.....	49
43	Розквіт.....	50
44	Кругозір.....	51
45	Клад.....	52
46	Кубок.....	53
47	Дачнянка.....	54
48	Палітра.....	55
49	Фортеця.....	56
50	Понтійка.....	57
51	Перевага.....	58
52	Пейзаж.....	59
53	Гладь.....	60
54	Гейзер.....	61
55	Громада.....	62
56	Блискучий.....	63
57	Престижний.....	64
58	Шляхетний.....	65
59	Яскравий.....	66
60	Золоте руно.....	67
61	Гавань.....	68
62	Бурштин.....	69
63	Гардемарин.....	70
64	Прозорий.....	71
65	Континент.....	72
66	Лайнер.....	73
67	Акведук.....	74
68	Босфор.....	75
69	Ареал одеський.....	76
70	Фактор одеський.....	77
71	Достойний.....	78
72	Буревій.....	79
73	Снігова королева.....	80
74	Дев'ятий вал.....	81
75	Валькірія.....	82
76	Гордість Пальміри.....	83
77	Скарб Пальміри.....	84
78	Сталкер.....	85
79	Адапт.....	86
80	Вакула.....	87
81	Командор.....	88
82	Еней.....	89
83	Аватар.....	90
84	Галичанин.....	91
85	Моураві.....	92
86	Таманго.....	93

87	Надійний.....	94
88	Грааль.....	95
89	МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В. М. РЕМЕСЛА НААН УКРАЇНИ.....	96
90	МІП Ассоль.....	97
91	Балада миронівська.....	98
92	МІП Валенсія.....	99
93	Грація миронівська.....	100
94	МІП Дніпрянка.....	101
95	Трунівниця миронівська.....	102
96	Ювілейна Патона.....	103
97	ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УКРАЇНИ.....	104
98	Херсонська 99.....	105
99	Херсонська фортеця.....	106
100	Овідій.....	107
101	Ледя.....	108
102	Кошова.....	109
103	Марія.....	110
104	Росинка.....	111
105	Соборна.....	112
106	Аквілегія.....	113
107	Кассіопея.....	114
108	Андромеда.....	115
109	Дніпряна.....	116
110	ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я ЮР'ЄВА НААН УКРАЇНИ.....	117
111	Диво.....	118
112	Гайок.....	119
113	Патріотка.....	120
114	Вигадка.....	121
115	Принада.....	122
116	Здобна.....	123
117	Запашна.....	124
118	Метелиця харківська.....	125
119	Барвіста.....	126
120	Деміра.....	127
121	Ксантия.....	128
122	Юніка.....	129
123	Подив.....	130
124	Аграрій.....	131
125	Модерн.....	132
126	Авгур.....	133
127	Шедевр.....	134
128	Булат харківський.....	135
129	Достаток харківський.....	136
130	Воля харківська.....	137

131	Зліт харківський.....	138
132	Скарб харківський.....	139
133	Меценат.....	140
134	Гайдук.....	141
135	Царевич.....	142
136	Оплот.....	143
137	БІЛОЦЕРКІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІБЕКІЦБ НААН УКРАЇНИ.....	144
138	Царівна.....	145
139	Лісова пісня.....	146
140	Либідь.....	147
141	Легенда білоцерківська.....	148
142	Муза білоцерківська.....	149
143	Зорепад білоцерківський.....	150
144	Відрада.....	151
145	Квітка полів.....	152
146	Грація білоцерківська.....	153
147	Перлина Лісостепу.....	154
148	Романтика.....	155
149	Водограй білоцерківський.....	156
150	Рось.....	157
151	Розумниця.....	158
152	Лірика.....	159
153	Зоря ланів.....	160
154	Евріка.....	161
155	ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ, ТОВ «ВОСКОР-АГРО».....	162
156	Артеміда.....	163
157	Артоплот.....	164
158	Зоря України.....	165
159	Європа.....	166
160	Наварра.....	167
161	Стратег.....	168
162	Ласкаве.....	169
163	Оріанна.....	170
164	Алатир.....	171
165	Сіріус.....	172
166	Ремарка.....	173
167	Патрицій.....	174
168	Босфор.....	175
169	ІННІ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УКРАЇНИ.....	176
170	Фортеця поліська.....	177
171	Співанка поліська.....	178
172	Кесарія поліська.....	179
173	Полісянка.....	180

174	Пирятинка.....	181
175	Пам'яті Гірка.....	182
176	Водограй.....	183
177	Ефектна.....	184
178	Престижна.....	185
179	Краєвид.....	186
180	Аналог.....	187
181	Недра.....	188
182	Рання 93.....	189
183	ПССДП «БОР».....	190
184	Крепиш.....	191
185	Озерна.....	192
186	Сталева.....	193
187	Тайра.....	194
188	Магнітка.....	195
189	Шаховка.....	196
190	ТОВ «САДИ УКРАЇНИ».....	197
191	Турі.....	198
192	Ліль.....	199
193	Кан.....	200
194	Орлеан.....	201
195	Лаваль.....	202
196	ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ».....	203
197	Глаукус.....	204
198	Саласар.....	205
199	Понтікус.....	206
200	Фаустус.....	207
201	VITERRA SEED.....	208
202	Атлон.....	209
203	Фелікс.....	210
204	Катаріна.....	211
205	Центуріон.....	212
206	Андрада.....	213
207	Трубліон.....	214
208	Пітон.....	215
209	ГК Корос.....	216
210	КАСАТ СЕМЕНС.....	217
211	Софру.....	218
212	Софікс.....	219
213	Сорріал.....	220
214	СОРТИ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ДЕРЖАВНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ.....	221
215	СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	222



**СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ
ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА
СОРТОВИВЧЕННЯ**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Антонівка

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	5,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,96
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,8)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Стійкість до осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошністої роси (бал)	дуже висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,4-30,8
Сила борошна (W), о.а.	414
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100-1250
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до захворювань
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Благодарка одеська

Рік реєстрації	2009
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2007-2009 рр.)	5,97
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,00
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	265-274
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	35,7
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	29,9
Сила борошна (W), о.а.	340
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ліра одеська

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2011-2013 рр.)	5,17
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,86
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	76,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,4
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	30,6
Сила борошна (W), о.а.	411
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1140
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	позитивна реакція на підвищене азотне живлення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

Сорт Журавка одеська

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2009-2010 рр.)	7,62
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,85
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,3
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	висока (8,3)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошністої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,4-13,8
Масова частка клейковини, %	29,5
Сила борошна (W), о.а.	380
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1460
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	універсального типу,
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Нива одеська

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrosperrum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,91
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	29,9
Сила борошна (W), о.а.	339
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Щедрість одеська

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,86
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	65,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	36,8
Масова частка білку, %	14,3
Масова частка клейковини, %	30,4
Сила борошна (W), о.а.	273
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до фітозахворювань
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мудрість одеська

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	4,83
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,97
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	74,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,6)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,7
Сила борошна (W), о.а.	288
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1110
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	напіврозлогий тип кущення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гарантія одеська

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	4,46
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,24
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,8
Сила борошна (W), о.а.	315
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до екологічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Катруся одеська

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	5,36
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,77
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (7,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	витримує відхилення у строках сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кантата одеська

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,82
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,4)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,6)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,4
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	284
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	потреба в яровизації 45-50 діб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Оранта одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,86
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,5
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	41,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,4
Сила борошна (W), о.а.	295
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	потреба в яровизації 20-25 діб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Житниця одеська

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,80
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньоранні
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	276
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Нота одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,67
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,07
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,8
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,1)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	41,4
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	329
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	позитивна реакція на підвищення норм висіву
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Октава одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,97
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,3
Група стиглості	ранньостиглі
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	42,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	286
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до вирощування по гіршим попередникам
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ліга одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,92
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,3
Група стиглості	серелньостиглі
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	294
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Дума одеська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,87
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	79,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	268
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінна
Особливості сорту	висока позитивна реакція на азотні добрива
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Оптима одеська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,98
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,18
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,6)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,8
Сила борошна (W), о.а.	322
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	стійкий до екстремальних умов посухи
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Родзинка одеська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	6,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,00
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	76,8
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	298
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	Потреба в яровизації 50-55 діб,
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Манера одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	5,60
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,98
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	40,5
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,5
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	скоростиглість у поєднанні з високою продуктивністю
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Досконалість одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,85
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	71,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,2)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	40,8
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,8
Сила борошна (W), о.а.	262
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	позитивна реакція на мінеральний азот
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Версія одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,57
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,88
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	71,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,8)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	26,3
Сила борошна (W), о.а.	267
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	ксеморфна структура рослин з ериктоїдним прапорцевим листком
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перспектива одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,92
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	12,5
Масова частка клейковини, %	25,3
Сила борошна (W), о.а.	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860
Група за якістю	філер
Особливості сорту	витривалість до пізніх строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Спадщина одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,20
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	78,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	6,5
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,3
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	298
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	здатний до продуктивного кушення у ранньовесняний період
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Покровська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,94
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,98
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	пластичний до ранніх та пізніх строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Довіра одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,21
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,6
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	343
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1150
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витримує пізні та надпізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Злагода одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,12
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,3
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,9
W о.а.	260
Сила борошна (W), о.а.	1150
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	цінна
Особливості сорту	придатний для умов зрошення, витримує ранні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Відповідь одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,15
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,01
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,1
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	227
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до основних хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Основа одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,05
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	303
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до основних хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перемога одеська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,42
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,99
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	77,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,0
Масова частка білку, %	13,4
Масова частка клейковини, %	26,6
Сила борошна (W), о.а.	279
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока зимо- та морозостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Годувальниця одеська

Рік реєстрації	2009
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2007-2008 рр.)	6,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,03
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,7)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,4)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	14,6
Масова частка клейковини, %	32,0
Сила борошна (W), о.а.	419
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Литанівка

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2007-2009 рр.)	6,29
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,87
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,6)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	305
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Мелодія одеська

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,12
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,01
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,8)
Морозостійкість (бал)	вище середня
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,2)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	37,7
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	30,8
Сила борошна (W), о.а.	347
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	потреба в яровизації (22-25 діб)
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Аксіома одеська

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,06
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,97
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	74,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,0
Масова частка білку, %	12,9
Сила борошна (W), о.а.	26,1
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	283
Об'єм хліба, мл	900
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витривалий до ранніх строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зиск

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білі
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,84
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,09
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	74,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,1
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	306
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пилипівка

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2010-2011 рр.)	6,74
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,89
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	110
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	450
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1480
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	менш чутливий до зміщення строків сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Обряд

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,91
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,92
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	72,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	39,3
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	30,0
Сила борошна (W), о.а.	337
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перепілка

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,48
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,93
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	придатний до вирощування в умовах зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гурт

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,31
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,86
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	вище середньої (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	14,3
Масова частка клейковини, %	29,3
Сила борошна (W), о.а.	391
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1130
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ветеран

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,88
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,72
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,6)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,1)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,2)
Маса 1000 зерен, г	37,7
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	313
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Наснага

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	5,02
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,01
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	69,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,7)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1120
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до вирощування в умовах зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Сториця

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	5,16
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,11
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (7,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	придатний до вирощування в умовах зрошення
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Розквіт

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,23
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,83
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,2)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,0
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	299
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	добре реагує на підживлення азотними добривами
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кругозір

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,79
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,02
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,2
Сила борошна (W), о.а.	348
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Клад

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,81
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,97
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,3)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,5)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,8
Сила борошна (W), о.а.	300
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	негативно реагує на ранні та пізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кубок

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,73
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,28
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	36,8
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	372
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	підвищена посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Дачнянка

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,73
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,00
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	9,0
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	9,0
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	середня (6,0)
Маса 1000 зерен, г	35,6
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	220
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	витривалий до низьких агрофонів
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Палітра

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,80
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,86
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	27,7
Сила борошна (W), о.а.	220
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Особливості сорту	підвищене кущення
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фортеця

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,08
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	70,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	витримує пізні строки сівби
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Понтійка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,59
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,5
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	312
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перевага

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,33
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пейзаж

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,00
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	71,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гладь

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,25
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	79,1
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,3
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	303
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1090
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	висока посухостійкість та морозостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гейзер

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,49
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,3)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,2
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	302
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до фузаріозу колоса
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Громада

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,25
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	316
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	стійкий до фузаріозу колоса
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

Сорт Блискучий

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,97
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,9)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	44,2
Масова частка білку, %	13,5
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Престижний

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>leucomelan</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	чорний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сорто випробування (2015-2018 рр.)	4,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,01
Група за висотою	короткостебловий
Середня висота рослин (см)	76,2
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,3)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	48,8
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

Сорт Шляхетний

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,74
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,91
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	79,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	низька (3,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,3)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,3)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,6
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Яскравий

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>leucomelan</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	чорний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,96
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	46,3
Масова частка білку, %	13,6
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Золоте руно

Рік реєстрації	2004
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2018 рр.)	5,53
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2019 р.)	7,64
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	105,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,5)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	46,3
Масова частка білку, %	16,0
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Гавань

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2009-2011 рр.)	6,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 р.)	6,78
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	95,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,5)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	13,0
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	стійкість до проростання зерна на пні
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Бурштин

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	6,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 р.)	6,24
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (5,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	13,5
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	потреба в яровизації (22-25 діб)
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Гардемарин

Рік реєстрації	2006
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	6,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 рр.)	6,07
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	277
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	15,7
Загальна оцінка макаронних виробів	5,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

Сорт Прозорий

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,81
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 рр.)	3,78
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	вище середнього (6,2)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Полягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	44,5
Масова частка білку, %	14,4
Загальна оцінка макаронних виробів	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

Сорт Континент

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,98
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 р.)	6,17
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	73,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,8)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	42,8
Масова частка білку, %	14,3
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Лайнер

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,65
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 рр.)	4,31
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,7)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,9)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	45,4
Масова частка білку, %	13,1
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Акведук

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 рр.)	4,44
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	70,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	вище середнього (6,8)
Морозостійкість (бал)	нижче середнього (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Полягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	42,4
Масова частка білку, %	14,6
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	високостійкий до вилягання
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Босфор

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2009-2011 рр.)	6,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2016 рр.)	6,63
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	287
Зимостійкість (бал)	веще середня (6,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,7)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,9)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	14,2
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Ареал одеський

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	4,66
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2016 рр.)	6,52
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,2)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,7)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	46,4
Масова частка білку, %	13,0
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Фактор одеський

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,52
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,71
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	44,6
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка білку, %	13,0
Загальна оцінка макаронних виробів, бал	4,5
Особливості сорту	дворучка
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Достойний

Рік реєстрації	2006
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2004-2006 рр.)	6,01
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,51
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	87,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	249
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	середня (6,0)
Стійкість до чорної і кам'яної сажки (бал)	висока (7,5)
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білку, %	11,7
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	підвищена адаптивність до умов Півдня України
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Буревій

Рік реєстрації	2013
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2011-2013 рр.)	4,39
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,50
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	вище середнього (6,3)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Полягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,6)
Маса 1000 зерен, г	44,7
Масова частка білку, %	12,9
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	типово озимий
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Снігова королева

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,38
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,69
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	69,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	252
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	12,0
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Дев'ятий вал

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,34
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,89
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	90,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	249
Зимостійкість (бал)	вище середня (6,9)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,9)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Полягання (бал)	висока (7,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,7)
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білку, %	12,5
Напрямок використання	зерновий
Тип розвитку	дворучка
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт ВАЛЬКІРІЯ

Рік реєстрації	2018
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,71
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	77,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	249
Зимостійкість (бал)	висока (8,6)
Морозостійкість (бал)	4,0
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (7,2)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,6
Масова частка білку, %	11,7
Напрямок використання	зерновий
Тип розвитку	дворучка
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Гордість Пальміри

Рік реєстрації	2020
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>coeleste</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	гола
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	2,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,68
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	67,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	251
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	15,2
Напрямок використання	харчовий
Тип розвитку	дворучка
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ОЗИМИЙ)

сорт Скарб Пальміри

Рік реєстрації	2020
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	3,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,02
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	73,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	251
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,5
Масова частка білку, %	13,5
Напрямок використання	зерно
Тип розвитку	дворучка
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Сталкер

Рік реєстрації	1997
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (1995-1997 рр.)	6,14
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,37
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	81
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (6,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	середня (5,0)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	50,0
Вирівняність зерна, %	98,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Адапт

Рік реєстрації	1998
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>medicum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	гладенькі
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (1996-1998 рр.)	4,55
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,22
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	88
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	середня (5,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (7,2)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	47,0
Вирівняність зерна, %	97,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Вакула

Рік реєстрації	2003
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>pallidum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2001-2003 рр.)	5,80
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,68
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	90
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,0
Вирівняність зерна, %	98,0
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	знижена фотоперіодична чутливість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Командор

Рік реєстрації	2007
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2005-2007 рр.)	5,51
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,06
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	65,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	76
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	48,0
Вирівняність зерна, %	96,0
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	для умов високоінтенсивного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Еней

Рік реєстрації	2008
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	5,45
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,21
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	76
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,9)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,4)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,9)
Маса 1000 зерен, г	50,0
Вирівняність зерна, %	98,0
Масова частка білку, %	10,2
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Аватар

Рік реєстрації	2014
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,71
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,28
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	58,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	80
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	45,3
Вирівняність зерна, %	96,0
Масова частка білку, %	13,2
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Галичанин

Рік реєстрації	2014
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>ricotense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	гладенькі
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	2,96
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,51
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	52,8
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	81
Посухостійкість (бал)	вище середнього (6,8)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,2)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Вирівняність зерна, %	89,8
Масова частка білку, %	14,0
Напрямок використання	фуражний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Моураві

Рік реєстрації	2018
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2018 рр.)	2,69
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,12
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	62,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	83
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осіпання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,4)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,7)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Вирівняність зерна, %	90,6
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Таманго

Рік реєстрації	2019
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	2,75
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,11
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	55,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	83
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Вирівняність зерна, %	93,0
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб і шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Надійний

Рік реєстрації	2020
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	2,62
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	3,01
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	61,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до внутрішньо стеблових шкідників (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,1
Вирівняність зерна, %	93,2
Масова частка білку, %	12,3
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб і шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Грааль

Рік реєстрації	2019
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	2,11
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	2,94
Група за висотою	короткостебловий
Середня висота рослин (см)	50,1
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	83
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Вирівняність зерна, %	92,2
Масова частка білку, %	12,6
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	високоінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп



**МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПШЕНИЦІ ІМЕНІ
В.М. РЕМЕСЛА НААН
УКРАЇНИ**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МП Ассоль

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,06
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,08
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	210
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	філер
Особливості сорту	позитивно реагує на внесення мікроелементів по колосу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Балада миронівська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,56
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,14
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,4
Сила борошна (W), о.а.	223
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	800
Група за якістю	філер
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт МП Валенсія

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,31
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,50
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	77,4
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	нижче середня
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,2
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	279
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	990
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Грація миронівська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,18
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,91
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,5
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,8
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,4
Сила борошна (W), о.а.	165
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	880
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

Сорт МП Дніпрянка

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 р.)	4,00
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,5
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	165
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока морозо- та зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Трудівниця миронівська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,72
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	273
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока морозо- та зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ювілейна Патона

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,06
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,7
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	237
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до фузаріозу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся



**ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОВОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА
НААН УКРАЇНИ**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Херсонська 99

Рік реєстрації	2005
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2002-2004 рр.)	5,24
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2016 р.)	5,50
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	253
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	14,5
Масова частка клейковини, %	32,0
Сила борошна (W), о.а.	223
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	650
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	підвищена зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Херсонська Фортеця

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,53
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	90,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	990
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Овідій

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2007-2009 рр.)	5,00
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,89
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	87,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	30,5
Сила борошна (W), о.а.	209
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1350
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Леда

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,82
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	95
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Полягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,8
Масова частка білку, %	14,5
Масова частка клейковини, %	29,2
Сила борошна (W), о.а.	209
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока стійкість до грибних захворювань
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кошова

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,43
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	5,08
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,1
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	29,2
Сила борошна (W), о.а.	304
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Марія

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2010-2013 рр.)	5,30
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,91
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	75,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Полягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	30,2
Сила борошна (W), о.а.	338
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1160
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт РОСИНКА

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2005-2007 рр.)	6,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,75
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	96,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	36,8
Сила борошна (W), о.а.	312
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1320
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Соборна

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,30
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	75,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Полягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	26,7
Сила борошна (W), о.а.	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Аквілегія

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospERMum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,51
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	26,4
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1130
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу, універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Кассіопея

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	5,97
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Морозостійкість	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,2)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Полягання (бал)	висока (8,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,5
Напрямок використання	харчовий
Загальна оцінка макаронів	висока (5,0)
Особливості сорту	стійкий до грибних захворювань
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Андромеда

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2010-2013 рр.)	4,72
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	269
Зимостійкість (бал)	вище середня (6,7)
Морозостійкість	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осипання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,1
Масова частка білку, %	14,1
Напрямок використання	харчовий
Загальна оцінка макаронів	4,0
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

сорт Дніпряна

Рік реєстрації	2000
Різновидність	<i>hordeiforme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (1998-2000 рр.)	5,42
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	78,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість проти мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	46,0
Масова частка білку, %	13,0
Загальна оцінка макаронів	3,4
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп



**ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА
ІМЕНІ В. Я. ЮР'ЄВА
НААН УКРАЇНИ**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Диво

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,58
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,71
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,1
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	353
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	продуктивний на високому агрофоні
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Гайок

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,68
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослий
Середня висота рослин (см)	78,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	270
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	28,2
Сила борошна (W), о.а.	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Патріотка

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,61
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,6)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	352
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Вигадка

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,28
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,74
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,3
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	245
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830
Група за якістю	філер
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Принада

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	слабке
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,60
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,46
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	79,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вищесередня
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,5
Сила борошна (W), о.а.	317
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Здобна

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,08
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	4,76
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,2)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,3)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,3
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	313
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Запашна

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,81
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2017 р.)	6,17
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	68
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вищесередня
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	14,1
Масова частка клейковини, %	29,8
Сила борошна (W), о.а.	310
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1120
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Метелиця харківська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 р.)	4,43
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	77,6
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,1
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	210
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Особливості сорту	групова стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт Барвиста

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospERMum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 р.)	1,69
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	65,9
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	85
Посухостійкість (бал)	висока (7,3)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,7)
Стійкість до бурі іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,7)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,4)
Маса 1000 зерен, г	35,2
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

сорт Деміра

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 р.)	1,99
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,3
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	89
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	13,2
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

сорт Ксантия

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>leucurum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	відсутнє
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 р.)	2,01
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	75,6
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (7,3)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	37,8
Масова частка білку, %	13,8
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ ПОЛБА ЗВИЧАЙНА (ЯРА)

сорт Юніка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>dissectum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Колос: ламкість	слабка
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	сильне
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 р.)	2,11
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	66,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	84
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,9
Масова частка білку, %	14,3
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Подив

Рік реєстрації	2016
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	2,38
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ (2020 р.)	2,73
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	56,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	85
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспоріозу (бал)	висока (7,8)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	45,5
Вирівняність зерна, %	95,3
Масова частка білку, %	13,3
Напрямок використання	фуражний
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Аграрій

Рік реєстрації	2014
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,10
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ 2020 р.)	3,10
Група за висотою	короткостебловий
Середня висота рослин (см)	55,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	81,0
Посухостійкість (бал)	висока (7,2)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,3)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,7)
Маса 1000 зерен, г	39,3
Вирівняність зерна, %	86,3
Масова частка білку, %	14,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напівінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Модерн

Рік реєстрації	2011
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>inerme</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	безоста
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	3,04
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	2,94
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	62,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	78
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої та кам'яної сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до листових хвороб (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Вирівняність зерна, %	96,6
Масова частка білку, %	13,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напівінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Август

Рік реєстрації	2017
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	3,65
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	2,97
Група за висотою	короткостебловий
Середня висота рослин (см)	64,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	89
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	9,0
Вилягання (бал)	висока (8,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,5)
Стійкість до сажки (бал)	висока (8,8)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Вирівняність зерна, %	93,8
Масова частка білку, %	13,3
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ (ЯРИЙ)

сорт Шедевр

Рік реєстрації	2019
Підвид	багаторядний (<i>vulgare</i>)
Різновидність	<i>rikotense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	гладенькі
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	1,78
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослий
Середня висота рослин (см)	51,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	84,0
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до гельмінтоспориозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до сажки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Вирівняність зерна, %	93,1
Масова частка білку, %	12,1
Напрямок використання	зерновий, для харчування
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

сорт Булат харківський

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,45
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	96
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурого іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	50,0
Масова частка білку, %	14,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

сорт Достаток харківський

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	3,44
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	96,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	99
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Череззерниця, %	15,0
Маса 1000 зерен, г	46,2
Масова частка білку, %	13,9
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

сорт Воля харківська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,50
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	98,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	84,0
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,7
Масова частка білку, %	14,0
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

сорт Зліт харківський

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,92
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група стиглості	середньостиглий
Середня висота рослин (см)	97,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	100
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осипання (бал)	висока (8,7)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	47,6
Масова частка білку, %	13,7
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	підвищена посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

сорт Скарб харківський

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,85
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група стиглості	середньостиглий
Середня висота рослин (см)	98,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	101
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	13,4
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ГОРОХ ПОСІВНИЙ

сорт Меценат

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>contecstum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насіннєвого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	1,95
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,21
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	45,1
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, днів	72
Посухостійкість (бал)	вище середнього (6,5)
Осіпання (бал)	висока (8,3)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до антракнозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	висока (8,9)
Маса 1000 зерен, г	238,6
Масова частка білку, %	21,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	безлисточковий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ГОРОХ ПОСІВНИЙ

сорт Гайдук

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>contecstum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насіннєвого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	3,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,11
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	84,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглі
Вегетаційний період, дів	83
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,3)
Вилягання (бал)	висока (7,2)
Придатність до механізованого збирання, (бал)	висока (7,8)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	50,5
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,8)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,6)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Стійкість до переноспорозу, бал	висока (8,7)
Маса 1000 зерен, г	221,0
Масова частка білку, %	24,8
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	безлисточковий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ГОРОХ ПОСІВНИЙ

сорт Царевич

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>contecstum</i>
Підрізновидність	<i>ecaducum</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве
Забарвлення насіннєвого рубчика	без рубчика
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	3,44
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	2,97
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	84,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	71
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	висока (8,3)
Вилягання (бал)	висока (7,1)
Придатність до механізованого збирання, (бал)	висока (8,5)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	50,5
Стійкість до аскохітозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до антракнозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Стійкість до переноспорозу, бал	висока (8,7)
Маса 1000 зерен, г	230,0
Масова частка білку, %	22,6
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	безлисточковий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ГОРОХ ПОСІВНИЙ

сорт Оплот

Рік реєстрації	2011
Різновидність	<i>contecstum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насіннєвого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2008-2010 рр.)	2,72
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,17
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	50,0
Форма стебла	просте
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	77
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Придатність до механізованого збирання, (бал)	висока (8,0)
Висота прикріплення нижнього бобу, см	50,5
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (7,5)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (7,0)
Стійкість до переноспорозу, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	250,0
Масова частка білку, %	20,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	безлисточковий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Царівна

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	5,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,80
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	94,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,9)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,2)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,1
Сила борошна (W), о.а.	342
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1180
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	групова стійкість до захворювань
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Лісова пісня

Рік реєстрації	2009
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2006-2008 рр.)	6,28
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,70
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	280
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (8,8)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,3)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,7
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,0
Сила борошна (W), о.а.	331
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1040
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	посухостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Либідь

Рік реєстрації	2006
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2004-2006 рр.)	7,82
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,42
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	274
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	319
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1240
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Легенда Білоцерківська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,16
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,56
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (7,6)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,2)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	308
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	добре реагує на підвищені дози мінеральних добрив
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Муза білоцерківська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,51
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,3
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,7
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	274
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зорепад білоцерківський

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	біле
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,89
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,63
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	41,0
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	245
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	філер
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Відрада

Рік реєстрації	2010
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2008-2010 рр.)	7,56
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,97
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	висока (8,2)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,0
Масова частка білку, %	19,2
Масова частка клейковини, %	44,5
Сила борошна (W), о.а.	649
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1450
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Квітка полів

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,63
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	5,09
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,9)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,8)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,8)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Грація білоцерківська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,42
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,88
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	89,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухостійкий та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Перлина Лісостепу

Рік реєстрації	2001
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (1999-2001 рр.)	4,43
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,72
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,7)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,0
Масова частка білку, %	13,2
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	270
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Романтика

Рік реєстрації	2009
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2007-2009 рр.)	6,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,88
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	89
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,6)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,8)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0-50,0
Масова частка білку, %	14,0-15,0
Масова частка клейковини, %	29,0-32,0
Сила борошна (W), о.а.	292
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	сівба в кінці оптимальних строків
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Водограй білоцерківський

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,39
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,92
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,2)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,7
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	183
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	850
Група за якістю	філер
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Рось

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	3,66
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,90
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	12,8
Масова частка клейковини, %	26,1
Сила борошна (W), о.а.	227
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	770
Група за якістю	філер
Особливості сорту	підвищена зимостійкість та посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Розумниця

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,74
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,9
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,6
Сила борошна (W), о.а.	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	підвищена зимостійкість та посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Лірика білоцерківська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,14
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,2
Сила борошна (W), о.а.	205
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	філер
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Зоря ланів

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,17
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	87,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,6
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,9
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ СПЕЛЬТА ОЗИМА

сорт Евріка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	3,63
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	98,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	50,3
Масова частка білку, %	15,6
Масова частка клейковини, %	29,4
Сила борошна (W), о.а.	130,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820
Група за якістю	філер
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся



**ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
СЕЛЕКЦІЇ**



ТОВ «ВОСКОР-АГРО»

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Артеміда

Рік реєстрації	2008
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2005-2008 рр.)	6,20
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	44,0
Масова частка білку, %	15,5
Масова частка клейковини, %	30,0
Сила борошна (W), о.а.	292
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	підвищена зимостійкість та посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Артаплот

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,67
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,8
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	підвищена зимостійкість та посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ПШЕНИЦЯ СПЕЛЬТА ОЗИМА

сорт Зоря України

Рік реєстрації	2012
Різновидність	<i>milturum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2010-2012 рр.)	5,50
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	2,74
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	110,0
Група стиглості	пізньостиглий
Вегетаційний період, діб	288
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	висока (8,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	22,0
Масова частка клейковини, %	висока (7,0)
Сила борошна (W), о.а.	290
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1230
Напрямок використання	дієтичне харчування
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ СПЕЛЬТА ОЗИМА

сорт Європа

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	5,80
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2019 р.	5,86
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	110,0
Група стиглості	пізньостиглий
Вегетаційний період, діб	285
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	висока (8,0)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	висока (8,0)
Стійкість до кореневих гнилей (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	45,0
Масова частка білку, %	19,0
Масова частка клейковини, %	45,0
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	придатний до органічного землеробства
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

сорт Наварра

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospERMum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	біле
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	5,43
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	105,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	283
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Череззерниця, %	9,4
Маса 1000 зерен, г	47,0
Масова частка білку, %	13,9
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	схрещення із сортами спельти
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

сорт Стратег

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	біле
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,84
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	113
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	283
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської , бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	висока (8,0)
Череззерниця, %	4,8
Маса 1000 зерен, г	49,0
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	28,6
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	схрещення із сортами спельти
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЖИТО ОЗИМЕ

сорт Ласкаве

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>vulgare</i>
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,96
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,12
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	131,7
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньо-стеблових шкідників, (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви, бал	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	5,8
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	11,1
Число падіння, с	195,5
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ЖИТО ОЗИМЕ

сорт Оріана

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>vulgare</i>
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,76
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	116,8
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньо-стеблових шкідників, (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви, бал	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	6,4
Маса 1000 зерен, г	43,6
Масова частка білку, %	10,7
Число падіння, с	155,8
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ЖИТО ОЗИМЕ

сорт Алатир

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>vulgare</i>
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,76
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,17
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	116,8
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	висока (7,0)
Вилягання (бал)	середня (6,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньо-стеблових шкідників, (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви, бал	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	6,4
Маса 1000 зерен, г	43,6
Масова частка білку, %	10,7
Число падіння, с	155,8
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ЖИТО ОЗИМЕ

сорт Сіріус

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>vulgare</i>
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,03
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,05
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	136,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	262
Зимостійкість (бал)	висока (7,4)
Морозостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,1)
Осіпання (бал)	висока (8,3)
Вилягання (бал)	висока (8,5)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до внутрішньо-стеблових шкідників, (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до снігової плісняви, бал	дуже висока (9,0)
Череззерниця, %	6,4
Маса 1000 зерен, г	42,0
Масова частка білку, %	10,7
Число падіння, с	155,8
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

сорт Ремарка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>Erithromelan</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	світло-коричневі
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	білий
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,80
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,4
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	88
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до твердої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,3
Масова частка білку, %	15,0
Масова частка клейковини, %	40,0
Напрямок використання	харчовий
Особливості сорту	стійкий до хвороб і шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

сорт Патрицій

Рік реєстрації	2011
Підвид	дворядний (<i>distichum</i>)
Різновидність	<i>nutans</i>
Ознаки різновидності:	
Колос: за щільністю	нещільний
Колос: забарвлення	солом'яно-жовте
Остюки: зазубленість	зазублені
Зернівка: плівка	наявна
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	6,10
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	65,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	88
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до септоріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу колоса (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до летючої сажки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	44,0
Масова частка білку, %	9,0
Напрямок використання	пивоварний
Особливості сорту	висока екологічна пластичність
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ГОРОХ ПОСІВНИЙ

сорт Босфор

Рік реєстрації	2015
Різновидність	<i>contecstum</i>
Підрізновидність	<i>vulgare</i>
Ознаки різновидності:	
Стебло: фасціація	відсутня
Розмір насіння	середня
Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте
Забарвлення насіннєвого рубчика	світле
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	2,19
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Середня висота рослин (см)	74,4
Тип стебла	звичайне
Тип листя	безлисточкові (вусаті)
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	78
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,6)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до переноспорозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до корневих гнилей (бал)	висока (8,8)
Стійкість до аскохітозу (бал)	висока (8,4)
Стійкість до антракнозу (бал)	висока (8,4)
Маса 1000 зерен, г	219,1
Масова частка білку, %	22,4
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	придатний до збирання прямим комбайнуванням
Географічні та зонові рекомендації	Полісся



**НАЦІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»**



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фортеця Поліська

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>milturum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,25
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	266
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,3)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (7,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської, бал	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки, бал	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,4
Сила борошна (W), о.а.	211
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	720
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Співанка Поліська

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,53
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,91
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	89
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	нижче середня (4,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,5)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кесарія Поліська

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,32
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,88
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,9
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	265
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осипання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурі іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	159
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість та зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Полісянка

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	4,03
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,62
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	256
Зимостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	35,2
Масова частка білку, %	13,1
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	850
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пирятинка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,12
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	99,4
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	43,3
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	230
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пам'яті Гірка

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospertum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,25
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	5,20
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	86,8
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,1)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осипання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,1
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	192
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість та зимостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Водограй

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,68
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,93
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	92,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	261
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,9
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	219
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ефектна

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,14
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,6
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,2
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	28,3
Сила борошна (W), о.а.	219
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	770
Група за якістю	філер
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Престижна

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	4,85
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	5,31
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	97,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,4)
Осіпання (бал)	висока (8,5)
Вилягання (бал)	висока (7,8)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,6)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,4
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Краєвид

Рік реєстрації	2013
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2011-2013 рр.)	5,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	5,08
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,0
Група стиглості	сереньостиглий
Вегетаційний період, діб	271
Зимостійкість (бал)	висока (7,3)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	середня (6,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	40,6
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	30,2
Сила борошна (W), о.а.	315
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Аналог

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Лісостепу:	
Середня урожайність за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	6,07
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,70
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	88,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	276
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,2)
Осіпання (бал)	висока (8,2)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	42,8
Масова частка білку, %	14,8
Масова частка клейковини, %	31,0
Сила борошна (W), о.а.	355
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	посухо- та зимостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт Недра

Рік реєстрації	2007
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2005-2007 рр.)	4,70
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,16
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	98,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	102
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осипання (бал)	висока (8,4)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,4
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	комплексна стійкість до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

сорт Рання 93

Рік реєстрації	1996
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (1993-1995 рр.)	4,20
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,42
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	70,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	87
Посухостійкість (бал)	висока (7,8)
Осіпання (бал)	висока (8,4)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	41,4
Масова частка білку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	29,1
Сила борошна (W), о.а.	282
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся



ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БОР»



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Крепиш

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	5,33
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,8)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,9
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,0
Сила борошна (W), о.а.	195
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Озерна

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,53
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018 р.	5,34
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	267
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	дуже висока (9,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Сталева

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	5,43
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018 р.	5,07
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	81,0
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,1)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	43,9
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	короткий період яровизації (20 діб)
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Тайра

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	6,22
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2018 р.	5,37
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	78,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,5)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,2
Масова частка білку, %	13,6
Сила борошна (W), о.а.	27,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	260
Об'єм хліба, мл	980
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Магнітка

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 р.)	4,61
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,8
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	254
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	вище середня (6,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,5)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,2
Масова частка білку, %	12,9
Масова частка клейковини, %	26,2
Сила борошна (W), о.а.	180
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	800
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	універсального використання
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся


ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Шаховка

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,72
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	76,5
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,6)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	40,9
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	26,8
Сила борошна (W), о.а.	232
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	висока посухостійкість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся



АГРОФІРМА «САДИ УКРАЇНИ»



А Г Р О Ф І Р М А

Сади України

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Турі

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2014-2016 рр.)	5,36
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	85,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	висока (7,3)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	висока (8,7)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,4)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,1
Масова частка білку, %	13,0
Масова частка клейковини, %	28,9
Сила борошна (W), о.а.	299
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	універсального типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Ліль

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,78
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	67,0
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напівінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Кан

Рік реєстрації	2016
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2013-2015 рр.)	5,17
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	93,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	268
Зимостійкість (бал)	висока (8,4)
Морозостійкість (бал)	висока (7,4)
Посухостійкість (бал)	висока (8,3)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,4)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,9)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,3)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,2
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	29,0
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напівінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Орлеан

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,50
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	83,0
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	263
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	висока (7,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,6)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,2
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	29,5
Сила борошна (W), о.а.	275
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050
Група за якістю	цінний
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	напівінтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Лаваль

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescens</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,60
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	69,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (6,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (8,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	37,5
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	224
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920
Група за якістю	філер
Напрямок використання	зерновий
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся



ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ»



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Глаукус

Рік реєстрації	2014
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,56
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,92
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	100-110
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	273
Зимостійкість (бал)	висока (7,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (7,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	висока (7,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	46,6
Масова частка білку, %	11,5
Масова частка клейковини, %	28,4
Сила борошна (W), о.а.	273
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до забур'янення
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Саласар

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2012-2014 рр.)	4,21
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	64,9
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,6
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,0
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт ПОНТІКУС

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,79
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,13
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	75,3
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (7,9)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,6)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,3)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,7)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	14,4
Масова частка клейковини, %	28,7
Сила борошна (W), о.а.	276
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	інтенсивного типу
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт ФАУСТУС

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	обоє відсутні
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	5,79
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,29
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	82,2
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,5)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	214
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	філер
Особливості сорту	конкурентна здатність до бур'янів
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся



VITERRA SEED



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Атлон

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,92
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,71
Група за висотою	напівкарлик
Середня висота рослин (см)	67,3
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,2)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,8)
Осіпання (бал)	висока (8,9)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,6)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,8)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (7,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,9
Сила борошна (W), о.а.	267
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Степ, Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Фелікс

Рік реєстрації	2018
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2016-2018 рр.)	5,50
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,01
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	72,7
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	259
Зимостійкість (бал)	висока (8,3)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,7)
Осіпання (бал)	висока (8,8)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,4)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,9)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,5
Масова частка білку, %	14,0
Масова частка клейковини, %	29,6
Сила борошна (W), о.а.	328
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010
Група за якістю	сильна
Особливості сорту	посухостійкий
Географічні та зонові рекомендації	Степ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Катаріна

Рік реєстрації	2017
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2015-2017 рр.)	4,86
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,12
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	58,6
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	36,3
Масова частка білку, %	13,5
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Центуріон

Рік реєстрації	2019
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	3,77
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,87
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	70,7
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	255
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,4
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,6
Сила борошна (W), о.а.	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810
Група за якістю	філер
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Андрада

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>ferugineum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	червоний
Остюки: колір	червоний
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	3,96
Урожайність (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	4,96
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	70,9
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	257
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	середня (5,5)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	42,6
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	28,5
Сила борошна (W), о.а.	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Трублiон

Рiк реєстрацiї	2020
Рiзновиднiсть	<i>lutescense</i>
Ознаки рiзновидностi:	
Колос : остюки або зубцi (наявнiсть)	наявнi зубцi
Колос: колiр	бiлий або солом'яно-жовтий
Остюки: колiр	бiлий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернiвка: колiр	червоний
Результати польових дослiджень у зонi Степу:	
Середня урожайнiсть (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,14
Урожайнiсть (т/га) в ННПЦ МНАУ у 2020 р.	3,72
Група за висотою	низькорослi
Середня висота рослин (см)	63,0
Група стиглостi	середньостиглий
Вегетацiйний перiод, дiб	258
Зимостiйкiсть (бал)	висока (8,0)
Морозостiйкiсть (бал)	низька (3,0)
Посухостiйкiсть (бал)	висока (7,0)
Осипання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стiйкiсть до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стiйкiсть до бурої iржi (бал)	дуже висока (9,0)
Стiйкiсть до фузарiозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стiйкiсть до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стiйкiсть до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	38,0
Масова частка бiлку, %	13,3
Масова частка клейковини, %	27,1
Сила борошна (W), о.а.	266
Об'єм хлiба зi 100 г борошна, мл	910
Група за якiстю	цiнний
Особливостi сорту	стiйкий до хвороб
Географiчнi та зоновi рекомендацiї	Лiсостеп, Полiсся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт Пітон

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,93
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	напівкарлики
Середня висота рослин (см)	65,4
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	середня (6,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,3)
Посухостійкість (бал)	середня (6,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	36,0
Масова частка білку, %	13,7
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	290
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт ГК Корос

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,87
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	середньорослі
Середня висота рослин (см)	80,1
Група стиглості	середньоранній
Вегетаційний період, діб	264
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	низька (4,0)
Посухостійкість (бал)	висока (7,0)
Осіпання (бал)	дуже висока (9,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	висока (8,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,4
Масова частка білку, %	14,2
Масова частка клейковини, %	27,8
Сила борошна (W), о.а.	271
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Полісся



KACAT CEMENC



ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОФРУ

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>erithrospermum</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні остюки
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2018-2020 рр.)	4,37
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	62,1
Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	40,0
Масова частка білку, %	13,8
Масова частка клейковини, %	27,3
Сила борошна (W), о.а.	307
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт СОФІКС

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червоний
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,16
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	64,5
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	258
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,0)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	дуже висока (9,0)
Маса 1000 зерен, г	39,6
Масова частка білку, %	13,6
Масова частка клейковини, %	27,5
Сила борошна (W), о.а.	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000
Група за якістю	цінний
Особливості сорту	стійкий до хвороб та шкідників
Географічні та зонові рекомендації	Полісся

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

сорт CORRIAL

Рік реєстрації	2020
Різновидність	<i>lutescense</i>
Ознаки різновидності:	
Колос : остюки або зубці (наявність)	наявні зубці
Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий
Остюки: колір	білий
Нижня колоскова луска: опушення	неопушене
Зернівка: колір	червона
Результати польових досліджень у зоні Степу:	
Середня урожайність (т/га) за роки державного сортовипробування (2017-2019 рр.)	4,40
На дослідному полі ННПЦ МНАУ проходить випробування вперше	
Група за висотою	низькорослі
Середня висота рослин (см)	60,2
Група стиглості	середньостиглий
Вегетаційний період, діб	260
Зимостійкість (бал)	висока (8,0)
Морозостійкість (бал)	дуже низька (2,5)
Посухостійкість (бал)	висока (8,0)
Осіпання (бал)	висока (8,0)
Вилягання (бал)	висока (8,0)
Стійкість до борошнистої роси (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до бурої іржі (бал)	висока (8,0)
Стійкість до фузаріозу (бал)	дуже висока (9,0)
Стійкість до мухи шведської (бал)	висока (8,0)
Стійкість до клопа-черепашки (бал)	висока (8,0)
Маса 1000 зерен, г	38,8
Масова частка білку, %	13,9
Масова частка клейковини, %	28,1
Сила борошна (W), о.а.	318
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200
Група за якістю	сильний
Особливості сорту	висока якість
Географічні та зонові рекомендації	Лісостеп, Полісся

Сорти, які проходять державну кваліфікаційну експертизу

№ п/п	Культура	Сорт	Назва установи
1	Пшениця м'яка озима	Позиція одеська	СГІ - НЦНС
2		Максіма	
3		Вигода одеська	
4		Рапсодія	
5		Перлина Степу	Інститут зрошуваного землеробства НААН
6		Дніпряна	
7		Красуня поліська	ННЦ «Інститут землеробства НААН»
8		Любіто	
9		Очаковка	ПССДП «Бор»
10		Ніка поліська	ФГ «Дворецький
11		Гарпія	ВНІС
12		Олівія	
13		Редвест	
14		Артанія	
15		Альберта	
16		Альжбета	
17		Мулатка	
18		Саласар	Штрубе
19		Раустус	
20		ТАТА МАТА	ЗААТЕН УНІОН
21	Тритикале озиме	Єлаць	ФГ «Дворецький
22		Довбушанське	
23		Пудік	
24	Горох посівний	Капітан	ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Довідник сортів озимої пшениці / В. С. Шебанін, О. А. Коваленко, М. М. Корхова [та ін.] ; за ред. проф. В. С. Шебаніна. Миколаїв : МНАУ, 2016. 112 с.
2. Каталог озимі зернові - VITERRA SEED / Київ : ТОВ «VITERRA СІД», 2021. 15 с.
3. Каталог сортів зернових колосових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського національного аграрного університету / уклад. Гадзало Я. М., Шебанін В. С., Вожегова Р. А. та ін. Миколаїв : МНАУ, 2020. 180 с.
4. Каталог сортів і гібридів польових культур. / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва / Кобизєва Л. Н., Буряк Ю. І. Коломацька В. П. та ін. IP ім. В. Я. Юр'єва : Харків, 2021. 192 с.
3. Каталог сортів та гібридів : науково-методичні рекомендації. Литвиненко М. А., Лифенко С. П., Наконечний М. Ю та ін. / за ред. Соколова В. М. Одеса : СГІ - НЦНС, 2020. 176 с.
4. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 1. 784 с.
5. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 2. 395 с.
6. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 4. 183 с.
7. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 5. 395 с.
8. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. Вип 6. 705 с.
9. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. Вип 1. 1088 с.
10. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. Вип 2. 372 с.
11. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип 1. 913 с.
12. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип 2. 536 с.
13. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. Вип 2. 970 с.
14. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. Вип 3. 237 с.
15. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України, Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. Вип 1. 1090 с.
16. Охорона прав на сорти рослин : Бюлетень / Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України, Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. Вип 2. 142 с.

Довідкове видання

КАТАЛОГ СОРТІВ
ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА
ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ МИКОЛАЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2021 РОЦІ

Авторський колектив:

Гадзало Ярослав Михайлович
Шебанін В'ячеслав Сергійович
Вожегова Раїса Анатоліївна
Соколов В'ячеслав Михайлович
Кормишкін Юрій Анатолійович
Димидов Олександр Анатолійович
Кобизєва Любов Никифорівна
Камінський Віктор Францевич
Артюшенко Наталя Павлівна
Парій Мирослав Федорович
Бузинний Микола Володимирович
Тарасенко Олександр Анатолійович
Ратушняк Віктор Пантелеймонович
Новіков Олександр Євгенович
Корхова Маргарита Михайлівна
Карпенко Микола Дмитрович

Комп'ютерна верстка: А. В. Чернова

Формат 60×84 1/16. Ум. друк арк. 14
Тираж 300 прим. Зам. № 58

Надруковано у видавничому відділі
Миколаївського національного аграрного університету
54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.

